

## ATTIVAZIONE DA C.O. 118

Ipotizzabili o necessarie  
manovre ad alto rischio  
di diffusione droplets\*?

SÌ

NO

- ▶ Mascherina filtrante FFP2/FFP3
- ▶ Doppi guanti non sterili
- ▶ Camice o tuta a maniche lunghe impermeabile con scritta "DPI"
- ▶ Dispositivi per protezione oculare (occhiali, occhiali a maschera, visiera)

In considerazione dell'enorme stress a cui sono quotidianamente sottoposte le forniture nazionali e internazionali di DPI, si raccomanda e si consiglia caldamente ad ogni Consorella e Confratello di **preservare quanto più a lungo possibile l'integrità dei DPI a uso strettamente personale** (mascherina chirurgica), in modo tale da aumentarne la longevità senza inficiarne l'efficacia preventiva e precauzionale. Occhiali, occhiali a maschera e visiera protettivi non sono monouso/usa e getta, ma possono essere sanificati con acqua, detergente e Amuchina dopo ogni uso.



**Far indossare al paziente** guanti monouso e mascherina chirurgica (preferibilmente quella di colore bianco in TNT denominata "Protezione Civile Nazionale").

- ▶ Mascherina chirurgica (compresa quella in Tessuto Non Tessuto - TNT)
- ▶ Doppi guanti non sterili
- ▶ Dispositivi per protezione oculare (occhiali, occhiali a maschera, visiera)
- ▶ Camice monouso a maniche lunghe idrorepellente in TNT

**A** Nell'assistenza ad ogni tipologia di paziente si raccomanda di **effettuare solo manovre estremamente necessarie**, per ridurre al minimo l'esposizione degli operatori a droplets.

**B** Per assicurare un uso più razionale dei DPI, si raccomanda di **ridurre**, per quanto possibile, **le seguenti manovre di rischio**: CPAP, aerosol terapia.

**C** Per la somministrazione di **ossigeno**, preferire in ogni caso l'utilizzo di maschere con reservoir o occhialini. Si sconsiglia l'utilizzo delle Ventimask.



### MANOVRE AD ALTO RISCHIO DI DIFFUSIONE DROPLETS

- ▶ Intubazione/gestione delle vie aeree
- ▶ CPAP
- ▶ Aerosol terapia

Tutte le **ambulanze dedicate allo specifico servizio COVID-19** sono dotate dei DPI necessari allo svolgimento del servizio stesso. Resta inteso che l'utilizzo dei dispositivi quali tuta e maschera FFP2/FFP3 è strettamente legato alle manovre ad alto rischio di diffusione droplets\*.



In accordo con il Tavolo di Coordinamento delle C.O. 118 Regione Toscana, si raccomanda a tutte le squadre in servizio, che si trovino a gestire un **paziente in ACR**, di astenersi dalla gestione del supporto delle vie aeree, ma procedere con il protocollo di rianimazione inerente al solo massaggio cardiaco esterno con l'utilizzo del DAE, fino all'arrivo del mezzo avanzato con sanitario a bordo.

